

Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016

ES Mentor

Éréscsoport: igen korai

Fajtafelhasználó: Lajtamag Kft.

Sumi Agro Hungary Kft.

Fajta tulajdonos: Euralis

Éréscsoportjának kiemelkedő képességű fajtája. Koraiságából következik, hogy desszikálás nélkül betakarítható. Rendkívül stabil szárú, jó állóképességű. Kezdeti fejlődése gyors.

A fajta jellegzetes megjelenését adja, hogy a felső nóduszokon a hüvelyek szinte csokorba rendeződnek. A termés jelentős része rendeződik ide, így jól betakarítható. Hektáronkénti fehérjehozama kiemelkedő. Világos köldökű, humán felhasználásra is alkalmas fajta.

Betegségeknek igen jól ellenálló fajta.

- Tenyészideje: 125-130 nap.
- Szárszilárdsága igen jó.
- Ezermagtömege: 165-195 g.
- Javasolt tőszám: 500-550 ezer csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: 45 cm.

Boglár

Éréscsoport: igen korai-korai

Fajta tulajdonos: Bóly Zrt.

A szárazságot jól tűrő, aszályos évjáratokban is kiemelkedő termést adó igen korai (00) érésű, új generációs fajtánk. Növekedési típusa féldeterminált, szárszilárdsága rendkívül jó.

Kiváló genetikai értékét mutatja, hogy az országos NÉBIH fajtakísérletekben 2012-ben az összes fajta és fajtajelölt közül terméshozama alapján abszolút első, 2013-ban pedig az éréscsoport legjobbjá volt, teljesítménye 20%-al múlta fölül a standardok hozamát.

A termelők körében is egyre népszerűbb fajta üzemi körülmények között is bizonyít, úgy a terméshozamát, mint szárállóságát illetően.

Az ország bármely szójatermesztő körzetében eredményesen termeszthető.

A harmonikus tápanyagellátottságú intenzív termesztést a késői fajtákat is meghaladó magas hozammal hálálja meg.

- Tenyészideje: 115-125 nap.

- Féldeterminált, kevésbé elágazó típusú.
- Szárszilárdsága kitűnő.
- Ezermagtömege: 160-190 g.
- Javasolt tőszám: 480-500 ezer csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: 24-50 cm.

Bokréta

Éréscsoport: igen korai-korai

Fajta tulajdonos: Bóly Zrt.

Kiemelkedő termésre képes, új, igen korai (00), intenzív fajta. Féldeterminált növekedési típusú, kevésbé elágazó, szárálló.

A fajta 2014-ben részesült állami elismerésben. Az országos NÉBIH kísérletekben 2013-ban termése 15,4 %-kal volt nagyobb a standardokénál. Fehérjetartalma az átlaghoz képest magasabb, 40-42 %.

A Bokréta fajtával az igen korai-korai érésűek választékát kívánjuk bővíteni, amelyek termésben elérik, vagy felülmúlhatják a hosszabb tenyészidejűek teljesítményét. A Bokréta után őszi kalászosok biztonságosan, időben vethetők.

Koraisága miatt az ország bármely szójatermesztő területére alkalmas. Intenzív, félintenzív termesztési körülményekhez ajánljuk.

- Tenyészideje: 110-125 nap.
- Szárszilárdsága igen jó.
- Ezermagtömege: 150-170 g.
- Javasolt tőszám: 480-500 ezer csíra/ha.
- Öntözéses termesztésnél: 450-470 ezer csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: 24-50 cm.

Sy-Eliot

Éréscsoport: igen korai

Fajtafelhasználó: Lajtamag Kft.

Fajta tulajdonos: Saatbau Linz eGen

Humán feldolgozásra kiválóan alkalmas, világos köldökű fajta. Lila virágú. Magas fehérje tartalmú. Terménye szójatej és tofu előállító cégek kedvelt alapanyaga, tesztjeik alapján jó ízanyagú. Az igen korai érésű csoportban érő fajtáink közül a legkorábban érő, rendkívül jó termésszinttel és termésstabilitással bíró fajta.

Ezermagtömege magas. Növénymagassága közepes, kezdeti fejlődése közepes. Szklerotiniával szemben különösen ellenálló.

- Tenyészideje: 115-120 nap.
- Szárszilárdsága igen jó.
- Ezermagtömege: 195-220 g.
- Javasolt tőszám: 500-550 ezer csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: 45 cm.

Prestopro

Éréscsoport: igen korai

Fajtafelhasználó: Galldorf Zrt.

Fajtatulajdonos: Northland Organic Europa Kft.

Igen korai éréscsoportú, középmagas, elágazásra hajlamos növény. Korai virágzású, virágszíne lila és hüvelye világos. Magja közepes nagyságú, lapított gömb formájú, köldöke sárga.

Fehérjetartalma 41 % feletti, olajtartalma 17-19 % közötti. NÉBIH irányadó étkezési szójafajta. Az északi területeken is jól bevált stabil termésű fajta.

- Ezermagtömege: 190-210 g.
- Javasolt tőszám: 450-500 ezer csíra/ha.
- Vetésmélység: 3-5 cm.
- Vetésidő: április 25-május 5 között, ha a talaj hőmérséklete 12-14 °C.
- Javasolt sortávolság: 45-50 (72) cm, de vethető sűrűsorosan is.

Bagera

Éréscsoport: korai

Fajtatulajdonos: MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet

A Bagera szójafajta származását tekintve svájci nemesítésű, ahol 2007-ben kapott állami elismerést. A fajta a 2012 és 2013 szélsőségesen aszályos esztendő ellenére is figyelemre méltó eredményeket produkált a versenytársai között, s ezért az eddigi termelői tapasztalatok alapján ígéretes szójafajtaként tekintünk rá.

A Bagera fajta a termelők számára azért lehet előnyös, mert koraisága mellett nagy termés elérésére is képes. Előveteményként is kedvező, hiszen utána őszi kalászos még biztonsággal vethető. Maghéja viszonylag kemény, ezért a betakarításkor a magháj kevésbé sérül meg.

Ökológiai körülmények között gazdálkodó termelők részére is ajánlható fajta.

- Szárszilárdsága jó.
- Ezermagtömege: 140-145 g.
- Növénymagasság: 110-115 cm.

- Virág szín: lila.
- Mag alakja és színe: kerekded, maghéj színe sárga.
- Köldökszín: sötétbarna.

Aires

Éréscsoport: korai

Fajta tulajdonos: Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.

Korai, féldeterminált, alacsony tripszin-inhibitor tartalmú fajta, amely kiváló szárszilárdsággal rendelkezik. Korai betakaríthatósága miatt megfelelő előveteménye a kalászosoknak.

Főbb jellemzői:

- Magja sárga színű, köldöke fekete.
- Barna szőrözöttségű növény.
- Közepes magasságú.
- Betegségekkel szembeni ellenállósága jó.
- Tripszin-inhibitor [TIU] tartalma: 12-15 mg/g.

Termesztési és agrotechnikai javaslatok:

Késői és normál vetéshez, kalászos előveteménynek javasoljuk

Felhasználási javaslatok:

Fajtáink fehérjében és olajban gazdag termése darálást követően, hőkezelés nélkül is etethető. Tejelő tehének esetében 2-3 kg/nap/egyed fejadagig, húsmarhák abraktakarmányába keverve a testtömeg figyelembe vétele mellett. Sertéstartásban a südő és hízó takarmánykeverékben 5-10 %-os mértékben, baromfiféléknél, az indító fázis kivételével, 10-15 %-os mértékben adható.

DH 4173

Éréscsoport: igen korai

Fajta tulajdonos: RWA (Raiffeisen-Agro) Magyarország Kft.

Legjobb magtermés jellemzi az éréscsoportjában (113,5%, MgSzH 2012). 2012-ben kapott állami elismerést.

Kiváló állóképességű és kipergés ellenállóságú fajta. Időjárási viszonyokhoz jól alkalmazkodik, szereti a jó tápanyagellátottságú és vízgazdálkodású területeket. Több emeletű virágképzés mellett jó magkötése biztosítja a kiemelkedő terméshozamot, ami a koraiságával párosul.

ES Gladiator

Éréscsoport: korai

Fajtatulajdonos: Euralis

Magas hozamú, a regisztráció évében első volt az éréscsoportjában Magyarországon. Kiemelkedően magas fehérjetartalmú (43%) fajta.

Kiváló szárszilárdság jellemzi, jól ellenáll az időjárás viszontagságainak. Szklerotiniával szemben jó ellenálló képességű.

- Szárszilárdsága: kiváló.
- Növénymagasság: 88 cm.
- Javasolt tőszám: 500 ezer csíra/ha.
- Terméspotenciál: 4,9 t/ha.

Sponsor

Éréscsoport: korai

Fajtafelhasználó: Sumi Agro Hungary Kft.

Fajtatulajdonos: Euralis

Hazánkban 2005-től szerepel a köztermesztésben. A termelők körében igen népszerű, megbízható, nagy terméseket hozó fajta. A termesztési körülményekhez kiválóan alkalmazkodik. Szárszilárdsága kiemelkedő. Féldeterminált, elágazó típusú. Szárszilárdsága kiemelkedő.

Az alsó hüvelyeket a talajtól 10-12 cm magasságban hozza, ezért a betakarítási veszteség minimális. Levél alakja ovális, a mag színe sárgás, köldöke barna. Az ország bármelyik szője termesztő körzetében eredményesen termesztethető.

A harmonikus tápanyag ellátást, az öntözést magas hozamokkal hálálja meg. Gabona előveteménynek kiváló.

- Vetés ideje: április közepe-vége.
- Betakarítás ideje: szeptember közepe – október eleje.
- Tenyészideje: 130-145 nap.
- Ezermagtömege: 160-175 g.
- Javasolt csíraszám: 480-500 ezer csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: 15-45 cm.

Éréscsoport: korai

Fajta tulajdonos: Margittasziget 92Kft.

Indeterminált növekedésű, középmagas, magas termőképességű fajta. Virágszíne lila. Magja közepes nagyságú, lapított gömb alakú. A köldök színe világosbarna.

- Tenyészideje: 140-150 nap.
- Szárszilárdsága jó.
- Ezermagtömege: 175-216 g.

ES-Mediator

Éréscsoport: korai

Fajtafelhasználó: Galldorf Zrt.

Fajtatulajdonos: Euralis

Hazánkban 2015-től szerepel a köztermesztésben, ez a legnagyobb termés potenciálú EURALIS szófafajta. A termesztési körülményekhez kiválóan alkalmazkodik.

Féldeterminált, elágazó típusú. Az alsó hüvelyeket a talajtól 12-13 cm magasságban hozza, ezért a betakarítási veszteség minimális. Növény magasság 91-95 cm, szárszilárdsága kiemelkedő. Levél alakja ovális, a nagy méretű mag színe sárgás, köldöke barna-fekete.

Az ország középső-déli szója termesztő körzetében eredményesen termeszthető, éréscsoportjának megfelelő termőhelyeken.

A harmonikus tápanyag ellátást, az öntözést magas hozamokkal hálálja meg. Gabona előveteménynek kiváló. Kultivátorozást meghálálja. Sclerotinia ellenállósága kiváló.

- Vetés ideje: április közepe-vége, május eleje, 10-12 °C talajhőmérséklet mellett.
- Betakarítás ideje: szeptember közepe – október eleje.
- Tenyészideje: 130-134 nap.
- Ezermagtömege: 190-195 g.
- Javasolt csíraszám: öntözés nélkül 550-600 000 csíra/hektár, öntözött körülmények között 400-450.000 csíra/hektár.
- Javasolt sortávolság: 24-45 cm, esetenként 72-80 cm.
- Virág színe: lila.
- Fehérjetartalom: 38-42 %.
- Olajtartalom: 18-19 %.

Isidor

Éréscsoport: középérésű

Fajtafelhasználó: Sumi Agro Hungary Kft.

Fajtatulajdonos: Euralis

Hazánkban 2006 óta van köztermesztésben. Ma a legnagyobb területen termesztett szójafajta. A termelők körében nagy népszerűségnek örvend. Kiemelkedően nagy terméseket hoz, üzemi körülmények között nem ritka a 4,5-5 tonna/hektár körüli termés. Az intenzív körülményeket kedveli, a harmonikus tápanyag ellátást, öntözést jól meghálálja, de száraz körülmények között sem okoz csalódást.

Féldeterminált, elágazó típus. Szárszilárdsága igen jó. Az alsó hüvelyek a talajtól 12-13 cm-re vannak, betakarítási veszteség így minimális. Levele ovális, magja sárgás, köldöke sötétbarna.

Ritkábbra sikerült vetés esetén 3-4 oldalhajtással ágazik el, kihasználva a tenyészterületet. Az ország középső – déli területén javasoljuk tenyésztését, ahol gabona előveteménynek is kiváló.

- Vetés ideje: április közepe-vége.
- Betakarítás ideje: szeptember vége, október közepe.
- Tenyészideje: 140-150 nap.
- Ezermag tömege: 200-230 g (igen nagy szemű).
- Javasolt csíraszám: 400–450 ezer csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: gabona sortávtól kukorica sortávig vethető.
- Virág színe: lila.
- Fehérje tartalom: 34-36 %.
- Olajtartalom: 17-19 %.

Bóbita

Éréscsoport: középérésű-kései

Fajta tulajdonos: Bóly Zrt.

Szárazságtűrő, különleges megjelenésű, középérésű fajta. Nagy értéke a kiegyenlített terméshozam, ami az aszályos évjáratokban is biztonságos, jövedelmező termést eredményez.

Gyors kezdeti fejlődésű, keskenylevelű, jellegzetes csúcsi virágzatú, jól elágazó fajta. Magja közepes nagyságú, gömbölyű, sötétebb sárga színű, piacos küllemű, humán célú termesztésre is keresett.

Hosszabb tenyészideje miatt (I-II éréscsoport) főleg az ország középső és déli szójatermesztő területeire ajánljuk, de egyes észak-keleti tájörzetekben is sikerrel termeszthető.

A különböző termesztési körülményekhez rendkívül jól alkalmazkodik. Kisadagú N műtrágyát igény, az ajánlott tőszámot célszerű betartani.

- Tenyészüsideje: 130-145 nap.
- Szárszilárdsága igen jó.
- Ezermagtömege: 130-150 g.
- Javasolt tőszám: 400-430 ezer csíra/ha,
széles sortávolság esetén 400 e csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: 24-76 cm.

BSF-1117/15 FJ.

Éréscsoport: középérésű-kései

Fajta tulajdonos: Bóly Zrt.

Igen jó termőképességű, élelmiszeripari minőségű magot adó állami elismerésre bejelentett fajtajelölt. Bólyban már 3 éve kiváló eredménnyel vizsgázott ez a szárazabb évjáratokban is kiegyenlített termést adó, karakteres fajta.

Gyors kezdeti fejlődésű, indeterminált növekedési típusú, igen jó szárszilárdságú. Az első hüvelyeket 18-20 cm magasan hozza. Magja rendkívül tetszetős, gömbölyű, maghéja erős, magköldök sárga, a héjjal azonos színű.

A Bóly Zrt. fajtakinálatában a leghosszabb tenyészüsidejű, közép-kései éréscsoportba tartozik, ezért az ország középső és déli szójatermesztő területekre ajánlható.

Intenzív termesztést igényel. Az elvárható nagy terméshozamhoz fokozottan figyelni kell a harmonikus tápanyagellátásra, és a javasolt állományűrség betartására.

- Tenyészüsideje: 140-150 nap.
- Szárszilárdsága igen jó.
- Ezermagtömege: 190-220 g.
- Javasolt tőszám: 400-430 ezer csíra/ha,
öntözéses termesztésnél és széles sortávolság esetén 370-400 e csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: 36-76 cm.

Pannónia Kincse

Éréscsoport: középérésű

Fajta tulajdonos: Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.

Az elmúlt években az egyik legelterjedtebb szójafajtává vált hazánkban, 2011-ben *OMÉK Agrárfejlesztési Díjat* kapott.

Klasszikusan nagyot termő, potenciális termőképessége intenzív körülmények között meghaladja az 5 tonnát hektáronként. Az évjárat-stabilitása a termesztett szóják közül kiemelkedő. Ezt bizonyítják a 2015-ös év eredményei is. Mind száraz, mind öntözött körülmények között termése jóval meghaladja a termesztett fajták átlagát. Folyton-növő, kiváló elágazó képességgel

rendelkező szója fajta, emiatt nem szükséges a túlsűrítése, már 500 000 mag/ha-os mennyiséggel vetve is sikeresen termeszthető.

Főbb jellemzői:

- Magja lapított gömb alakú, sárga színű, közepes méretű
- Köldöksíkja sárga színű
- Ezerszemtömege kiemelkedő
- Magtermése magas fehérje- és olajtartalmú
- Rendkívül jó szárszilárdságú, a nagy tömeg ellenére sem dől meg
- Betegségekkel szemben ellenálló
- Alkalmazkodóképessége kiváló

Termesztési és agrotechnikai javaslatok:

- Kiemelkedő kórtani tulajdonságai miatt növényvédelme alacsony költséggel megoldható
- Az átlagosnál magasabban elhelyezkedő alsó hüvelyek csökkentik a betakarítási veszteséget
- Nagyüzemi eredményei az aszályos években is igazolják kiváló alkalmazkodóképességét

Bahia

Éréscsoport: középérésű

Fajta tulajdonos: Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.

Középérésű, kiváló termőképességű, folyton-növő, alacsony tripszin-inhibitor tartalmú fajta, amely jó betegség-ellenállósággal rendelkezik.

Főbb jellemzői:

- Magja sárga színű, köldöke sötétbarna
- Barna szőrözöttségű növény
- Közepes magasságú
- Szárszilárdsága kiváló
- Tripszin-inhibitor [TIU] tartalma: 16,8-20 mg/g

Termesztési és agrotechnikai javaslatok:

- Jó talajokra, intenzív technológiához javasoljuk
- Az öntözésre jelentős terméstöbblettel reagál

Felhasználási javaslatok:

Fajtáink fehérjében és olajban gazdag termése darálást követően, hőkezelés nélkül is etethető. Tejelő tehének esetében 2-3 kg/nap/egyed fejadagig, húsmarhák abraktakarmányába keverve a testtömeg figyelembe vétele mellett. Sertéstartásban a süldő és hízó takarmánykeverékben 5-10 %-os mértékben, baromfiféléknél, az indító fázis kivételével, 10-15 %-os mértékben adható.

Steara

Éréscsoport: középérésű

Fajtafelhasználó: Lajtamag Kft.

Fajta tulajdonos: Saatbau Linz eGen

Kiemelkedő termőképességű fajtáink közül a leghosszabb tenyészidejű. Rendkívül alkalmas az ország déli fő szójatermő területein történő termesztésre. A középérésű csoport elején éri, de termésmennyisége eléri vagy meg is haladja a későbbi érésű fajtakét. Így a tenyészidő és a termőképesség kiváló kombinációját testesíti meg.

Virágszíne lila. Magja sötét köldökű, kisméretű. Viszonylag magas termetű, de állóképessége jó. Termetének következtében egyedei nem mindig állnak teljesen függőlegesen, de megdőlésre egyáltalán nem hajlamos. Elhúzódóan csapadékos őszi időjárás esetén deszikkálást be kell tervezni.

- Tenyészideje: 140-150 nap.
- Szárszilárdsága közepes.
- Ezermagtömege: 195-205 g.
- Javasolt tőszám: 450-500 ezer csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: 45 cm.

SG Eider

Éréscsoport: középérésű

Fajtafelhasználó: Lajtamag Kft.

Fajta tulajdonos: Saatbau Linz eGen

Magas terméspotenciállal rendelkező, középérésű fajta. Az ország déli, fő termőterületét jelentő vidékein is termesztethető. Egyenletesen érik be, ezért jól betakarítható fajta. Magpergésre nem hajlamos. A jó betakaríthatóságot tovább fokozza, hogy alsó hüvelyek magasan, a talaj felett 15 cm körül helyezkednek el. Szára stabil, igen jó állóképességű, megdőlésre nem hajlamos. Betegség ellenálló fajta.

Fehérjetartalma magas, humán feldolgozásra is kiválóan alkalmas.

- Tenyészideje: 140-150 nap.
- Szárszilárdsága jó.
- Ezermagtömege: 195-215 g.
- Javasolt tőszám: 450-500 ezer csíra/ha.
- Javasolt sortávolság: 45 cm.

Hipro

Éréscsoport: középérésű

Fajtafelhasználó: Galldorf Zrt.

Fajtatulajdonos: Northland Organic Europa Kft.

Középérésű, elágazásra hajlamos, biztonsággal termeszthető szójabab. Korai virágzású, virágszíne fehér, hüvelye világos. Magja nagy, vagy igen nagy alakú, lapított gömb formájú, köldöke sárga. Pergésre nem hajlamos.

Fehérjetartalma meghaladja a 42 %-ot, olajtartalma 16-17 % közötti. NÉBIH irányadó étkezési szójafajta. Kiegyenlített terméshozam és stabil fehérjetartalom jellemzi.

- Tenyészideje: 140-150 nap.
- Szárzilárdsága jó.
- Ezermagtömege: 200-225 g.
- Javasolt tőszám: 450-500 ezer csíra/ha.
- Vetésmélység: 3-5 cm.
- Vetésidő: április 15-május 5 között.
- Javasolt sortávolság: 45-50 (72) cm, de vethető sűrűsorosan is.