

**MAGYAR SZÓJA
ÉS FEHÉRJENÖVÉNY
EGYESÜLET
FAJTABEMUTATÓI**
2026



MAGYAR SZÓJA





**„A világ utat nyit annak
az embernek, aki tudja,
merre tart.”**

Ralph Waldo Emerson





A MAGYAR SZÓJA ÉS FEHÉRJENÖVÉNY EGYESÜLET CÉLKITÜZÉSEI

A Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület a magyar fehérjenövény termeszőket, feldolgozókat és felhasználókat magába foglaló szakmai szervezet. Alapvető célkitűzéseink között szerepel a magyar, genetikai módosítástól mentes szója és egyéb szemes fehérjenövények termésterületének növelése és feldolgozásának segítése, hogy a lehető legszélesebb körben lássuk el a termelőket információkkal és szakmai anyagokkal.

Ennek érdekében a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület a Magyar Szója Nonprofit Kft.-vel közösen rendszeresen szervez továbbképzéssel egybekötött szakmai fórumokat és bemutatókat.

2026-ban tizenharmadik alkalommal kerülnek megrendezésre a félüzemi fajtakísérletek bemutatói négy helyszínen (Hobol, Nyírtelek-Gyulatanya, Eperjes, Bak).

Ön most egy tájékoztató szakmai anyagot tart a kezében, amely az idei évi fajtakísérletekben szereplő fajták jellemző tulajdonságainak leírását tartalmazza. Reméljük, hogy ez a kiadvány segítséget nyújt Önnek a területre leginkább megfelelő szójafajták kiválasztáshoz!

MIÉRT A SZÓJA?



A szójatermesztés az évek során stratégiai jelentőségűvé vált mind gazdasági, mind agronómiai szempontból. A növekvő fehérjeigény, a fenntartható gazdálkodási elvárások és az európai GMO-mentes takarmány iránti kereslet egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a szója egyre fontosabb szerepet töltsön be a vetésszerkezetben.

A szója kiemelkedő növényi fehérjeforrás, amely nélkülözhetetlen az állattenyésztés és az élelmiszeripar számára. Az európai piac egyre nagyobb hangsúlyt fektet a helyben előállított, GMO-mentes alapanyagokra, ezért a hazai termesztésű szója versenyelőnyt jelenthet a termelők számára. A stabil kereslet és a kedvező piaci lehetőségek miatt a szója hosszú távon is jövedelmező kultúrának számít.

Agronómiai szempontból a szója fontos eleme a fenntartható növénytermesztésnek. Pillangós növényként képes megkötni a levegő nitrogénjét, így csökkentheti a műtrágyafelhasználást és javíthatja a talaj termékenységét. Vetésforgóban alkalmazva kedvező elővetemény-hatással rendelkezik, hozzájárul a talajszerkezet javításához és segíthet a növényvédelmi problémák mérséklésében is.

A klímaváltozás hatásai miatt a termelők egyre inkább olyan kultúrákat keresnek, amelyek jól illeszthetők a modern, precíziós gazdálkodási rendszerekbe. Az új generációs szójafajták jobb stressztűrő képességgel, stabilabb terméshozammal és magasabb fehérjetartalommal rendelkeznek, így alkalmazkodni tudnak a változó termesztési körülményekhez.

A szója nemcsak egy alternatív növény, hanem a fenntartható, versenyképes és jövőorientált mezőgazdaság egyik meghatározó eleme.

A VÍZ, MINT A TERMÉS KULCSA

A klímaváltozás következtében a szójatermesztésben egyre nagyobb jelentősége van a megfelelő vízgazdálkodásnak és az öntözésnek. Az elmúlt években tapasztalható szélsőséges időjárási viszonyok – a hosszabb aszályos időszakok, a hóhullámok és az egyenetlen csapadékeloszlás – komoly kihívások elé állítják a termelőket. A szója ugyan jó alkalmazkodóképességgel rendelkezik, azonban a kritikus fejlődési szakaszokban különösen érzékeny a vízhiányra. A virágzás és a hüvelyképződés időszaka a szója legnagyobb vízigényű fenológiai fázisa. Ebben az időszakban fellépő csapadékhány jelentős termés kiesést, alacsonyabb ezermagtömeget és csökkent fehérjetartalmat eredményezhet. Az öntözés lehetőséget biztosít arra, hogy a növény fejlődése kiegyensúlyozott maradjon még kedvezőtlen időjárási körülmények között is.



A szója vízigénye a fejlődés különböző szakaszaiban

Fejlődés szakasz	Időtartam (nap)	Átlagos vízigény (mm)
A vetéstől a virágzás kezdetéig	45-60	150
A virágzás kezdetétől az első hüvelyek megjelenéséig	20	100-120
Az első hüvelyek megjelenésétől az érettség beálltáig	50-65	220-250

Forrás: Antal József: Növénytermesztők zsebkönyve

A modern szójatermesztésben az öntözés már nem csupán termésbiztonsági tényező, hanem a magas terméspotenciál kihasználásának egyik alapfeltétele. Az intenzív technológiával termesztett, nagy genetikai potenciállal rendelkező fajták megfelelő vízellátás mellett képesek stabilan magas hozamot és kiváló minőséget biztosítani.

A precíziós öntözési rendszerek alkalmazása emellett hozzájárul a víz hatékony felhasználásához is. A talajnedvesség-monitoring és az időjárási adatok elemzése lehetővé teszi, hogy a termelők célzottan és gazdaságosan juttassák ki a szükséges vízmennyiséget. Ez nemcsak a termésbiztonságot növeli, hanem a fenntartható gazdálkodást is támogatja.

A jövő szójatermesztése egyre inkább az alkalmazkodóképességről szól. Az öntözés, a korszerű termesztéstechnológia és a megfelelő fajtakiválasztás együtt biztosíthatják azt a stabilitást és versenyképességet, amelyre a változó klimatikus viszonyok között a gazdálkodóknak szükségük van.

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

Fajta	Származási ország	Magyarországi fajtaképviselő
DANUBIA	Argentína	Véka Trade Kft.
ASTRAMELIX	Franciaország	Altoterra Kft.
ELGIN	Németország	Saaten-Union Hungária Kft.
ES PROFESSOR	Franciaország	Lajtamag Kft.
MAESTRAL	Szerbia	Betamag-Trade Kft.
SU ADEMIRA	Németország	Isterra Közép-Európa Kft.
ES COMPOSITOR	Franciaország	RWA Magyarország Kft.
ES LIBERATOR	Franciaország	Isterra Közép-Európa Kft.
ANIELLA	Ausztria	Saatbau Linz Hungária Kft.
AZOLIA	Ausztria	Saatbau Linz Hungária Kft.
ES DIRECTOR	Franciaország	Galldorf Zrt.
NAUTILUS	Szerbia	Betamag-Trade Kft.
APOLLINA	Ausztria	Lajtamag Kft.
LID CONSTRUCTOR	Franciaország	Galldorf Zrt.
POMPEI	Lengyelország	Agrár Auditker Kft./Szójamag Kft.
RGT SHIVA	Franciaország	Pannon-Mag-Agrár Kft.
ALLIDEA	Németország	Saaten-Union Hungária Kft.
LUISE PZO	Németország	RWA Magyarország Kft.
PASAT	Szerbia	Betamag-Trade Kft.

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

Kísérleti helyek				Érés csoport	Tenyészdő (nap)	Tőszám db csíra/ha	Oldal
Bak	Eperjes	Nyírtelek-Gyulatanya	Hobol (kontroll)				
		*	*	igen korai	100-115	450-500 000	10
*	*	*	*	igen korai	100-120	500-550 000	11
*	*	*	*	igen korai	105-110	600-650 000	12
*			*	igen korai	110-115	500-550 000	13
*	*	*	*	igen korai	110-115	550-600 000	14
		*	*	igen korai	110-115	600-650 000	15
*	*	*	*	igen korai	110-120	620-670 000	16
		*	*	igen korai	110-120	600-650 000	17
*	*	*	*	igen korai	110-129	600 000	18
		*	*	igen korai	110-133	600 000	19
		*	*	igen korai	115-120	500-550 000	20
		*	*	igen korai	115-120	550 000	21
	*		*	igen korai	115-125	600 000	22
		*	*	igen korai	115-125	500-550 000	23
*	*	*	*	igen korai	115-125	450 000	24
*		*	*	igen korai	115-125	500-550 000	25
*	*	*	*	korai	120-125	550-600 000	26
*	*	*	*	korai	120-130	500 000	27
	*		*	korai	120-130	500-550 000	28

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

Fajta	Származási ország	Magyarországi fajtaképviselő
RGT SAKUSA	Franciaország	Axereal Hungary Kft.
RGT SEFORA	Franciaország	Axereal Hungary Kft.
RGT SUZA	Franciaország	Pannon-Mag-Agrár Kft.
DILETTA	Argentína	Véka Trade Kft.
ALLUMIA	Ausztria	Saatbau Linz Hungária Kft.
DOROTHY	Olaszország	Isterra Közép-Európa Kft.
KAPRAL	Lengyelország	Agrár Auditker Kft./Szójamag Kft.
SHEILA	Franciaország	Gabonakutató Nonprofit Kft.
STINE 07P32	USA	Agro Masters Hungary Kft.
STINE 11N20	USA	Agro Masters Hungary Kft.
BONGO	Magyarország	Bóly Zrt.
BÉTABON	Magyarország	Bóly Zrt.
CAMERON	Olaszország	Isterra Közép-Európa Kft.
LEVENTE	Magyarország	Agrár Auditker Kft./Szójamag Kft.
LID BOUTONDOR	Franciaország	Galldorf Zrt.
ES GENERATOR	Franciaország	Isterra Közép-Európa Kft.
ES MEDIATOR	Franciaország	Galldorf Zrt.
POSEIDON	Szerbia	Betamag-Trade Kft.
RGT STRAVIATA	Franciaország	Axereal Hungary Kft.

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

Kísérleti helyek				Éréscsoport	Tenyészdő (nap)	Tőszám db csíra/ha	Oldal
Bak	Eperjes	Nyírtelek-Gyulatanya	Hobol (kontroll)				
*		*	*	korai	120-130	500-550 000	29
	*	*	*	korai	120-130	480-500 000	30
*		*	*	korai	120-130	500-550 000	31
*	*		*	korai	120-135	300-500 000	32
*	*		*	korai	120-136	600 000	33
*	*	*	*	korai	125-130	500-550 000	34
*	*	*	*	korai	125-130	450 000	35
*	*	*	*	korai	125-130	500 000	36
*	*	*	*	korai	125-130	350-400 000	37
*	*	*	*	korai	125-130	350-400 000	38
*		*	*	korai	125-140	450-500 000	39
*	*		*	korai	125-140	450-500 000	40
*	*		*	korai	128-130	500-550 000	41
*	*	*	*	korai	130-140	500 000	42
*	*		*	korai	130-140	450-500 000	43
*	*		*	közép	135-140	450-500 000	44
*	*		*	közép	135-145	400-430 000	45
*			*	közép	135-145	350-450000	46
*	*		*	közép	137-145	450 000	47

DANUBIA

Fajtatulajdonos:

DONMARIO Seeds

Fajtajogosult:

Véka Trade Kft.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	100 - 115 nap
Ezermagtömeg:	170 - 195 g
Javasolt tőszám:	450 - 500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 24 - 45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 15.
Fehérjetartalom:	39 - 41 %
Olajtartalom:	20 - 22 %



A DANUBIA egy igen korai érésű, GMO-mentes szójafajta, amelyet magas hozampotenciál és stabil minőség elérésére nemesítettek. Intenzív termesztési körülmények között is megbízható teljesítményt nyújt, és jól reagál a korszerű agrotechnológiára. A fajta indeterminált növekedésű, erőteljes fejlődésű. Világosbarna szárszörzet és lila virágzat jellemzi, levelei kicsik, tojásdad alakúak, ami elősegíti a kedvező állományklímát. A hüvelyek barnák, a magok sárgák és jól telítettek. Magas fehérjetartalmú, amely évjárástól függően kis mértékben változhat. Kiemelkedő terméspotenciállal rendelkezik, különösen jó talaj- és termesztési feltételek mellett. Ajánlott közepes és magas termékenyséű területekre. Erős szárszilárdságának köszönhetően jól ellenáll a megdőlésnek, így stabil és biztonságos betakarítást biztosít változó időjárási körülmények között is.

ASTRAMELIX

Fajtatulajdonos:

Farmsaat AG

Fajtajogosult:

Altoterra Kft.



Növekedés típusa:	determinált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészydő:	100 - 120 nap
Ezermagtömeg:	190 g
Javasolt tőszám:	500 - 550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	24 - 50 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	38 - 40 %
Olajtartalom:	18 - 20 %

Az ASTRAMELIX egy igen korai éréscsoportú szójafajta, amely a rövid tenészydő és a stabil termesztési biztonság kombinációjával támogatja a korszerű szójatermesztési technológiákat. Kifejezetten olyan termelők számára ajánlott, akik a korai betakarítást és a rugalmas vetésváltást helyezik előtérbe. A fajta egyenletes állományképzést biztosít, és jól reagál a korszerű agrotechnikai elemekre. Jó kezdeti növekedési erély, magas fehérjetartalom és nagyon jó növényegészség jellemzi, ami stabil és megbízható terméshozamot eredményez és ezáltal megbízható alapot nyújt a hatékony termeléshez.

ELGIN

Fajtatulajdonos:

Saaten-Union Hungária Kft.

Fajtajogosult:

Saaten-Union Hungária Kft.

Növekedés típusa:	determinált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	105 - 110 nap
Ezermagtömeg:	200 - 220 g
Javasolt tőszám:	600 - 650.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12,5 - 25 - 37,5 - 50 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	35 - 38 %
Olajtartalom:	23 - 24 %

Ígéretes hozamú, robosztus növényfelépítésű, kiváló állóképességű fajta. A magas hüvelykötés és az alacsony megdőlési hajlam együttesen biztosítja a kiemelkedő betakarítási hatékonyságot. A fajta magas olajhozamot ad, kedvező fehérjetartalom mellett. Stabil hozam mellett első sorban fő- de akár másodvetésekben is hasznosítható. Termesztése hozzájárul a talaj kiegyensúlyozott nitrogénellátottságához, így jó előveteményként szolgál a következő kultúra számára.



ES PROFESSOR

Fajtatulajdonos:

Lidea Hungary Kft.

Fajtajogosult:

Lajtamag Kft.

Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	110 - 115 nap
Ezermagtömeg:	218 g
Javasolt tőszám:	600 - 550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	18 - 50 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	39,7 %
Olajtartalom:	19 - 21 %

Az ES PROFESSOR igen korai szójafajta az ország északi szójatermesztő területeire is bátran javasolható. Erőssége, hogy éréscsoportjában kiemelkedő terméspotenciállal, ezermagtömeggel és fehérjetermeléssel rendelkezik. Kezdeti fejlődése és állóképessége jó. Az átlagos növénymagasság 75 cm. A mag köldökének színe barna. Élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas. Termesztése során a metribuzin hatóanyag tartalmú gyomirtó szerek használata nem javasolt.



MAESTRAL

Fajtatulajdonos:

Delta Agrar D.O.O. Szerbia

Fajtajogosult:

Betamag-Trade Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	110 - 115 nap
Ezermagtömeg:	155 - 180 g
Javasolt tőszám:	550 - 600.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	15 - 75 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - június 25.
Fehérjetartalom:	38 - 40 %
Olajtartalom:	20 - 21 %

A Betamag-Trade Kft. legkorábbi érésű fajtája. Termőképessége 3,5-4 t/ha. Fővetésre és másodvetésre egyaránt alkalmas. Magas termésre képes, korszerű fajta. Erőteljes gyors kezdeti fejlődés jellemzi. Pergésre nem hajlamos. Szára erős, állóképessége kiváló, megdőlésre nem hajlamos. Magassága átlagos (70-75 cm). A szemtermés jelentős része az oldalhajtásokon képződik. Egyöntetű érés jellemzi. Virágzata fehér színű. Elsősorban az ország középső-nyugati részén (Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok), illetve az észak-keleti vármegyékben (Borsod-Abaúj-Zemplén) gazdálkodók részére ajánljuk.

SU ADEMIRA

Fajtatulajdonos:

Ackermann Saatzucht GmbH

Fajtajogosult:

Isterra Közép-Európa Kft.

Növekedés típusa:	determinált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	110 - 115 nap
Ezermagtömeg:	230 g
Javasolt tőszám:	600 - 650.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12,5 - 25 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 20.
Fehérjetartalom:	40 - 43 %
Olajtartalom:	20 - 22 %



Az Isterra Közép-Európa Kft. első 000-ás fajtája az igen korai éréscsoportban. A németországi regisztráció során a standard fajták szintje felett, 112 %-kal minősítették. 2024-ben a Bajor állami kísérletek győztese volt. Koraiságából adódóan az áprilisi, május eleji vetés esetén augusztus végén, szeptember elején betakarítható. Az éréscsoport legelején érik, ezért takarmánykeverék, vagy korai árpa után másodvetésben is sikeres lehet. Akár június közepéig is vethető. Köldök színe világos, emiatt élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas.

ES COMPOSITOR

Fajtatulajdonos:

Lidea Hungary Kft.

Fajtajogosult:

RWA Magyarország Kft.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	110 - 120 nap
Ezermagtömeg:	180 - 200 g
Javasolt tőszám:	620 - 670.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 15.
Fehérjetartalom:	38 - 40 %
Olajtartalom:	22 - 23 %

A Lidea termékcsalád új fajtája. Kiemelkedő terméspotenciál jellemzi az igen korai éréscsoportban. A magok nagy méretűek, köldökük színe világos. Kiválóan alkalmas élelmiszer-feldolgozáshoz. Megdőlésre és pergésre nem hajlamos. A homokos és közép kötött talajokat kedveli. Szklerotínia és vírus betegségekkel szemben ellenálló. A metribuzin hatóanyagra érzékeny, ezért termesztése során az ilyen hatóanyag tartalmú készítményeket kerülni kell!



ES LIBERATOR

Fajtatulajdonos:

Lidea Hungary Kft.

Fajtajogosult:

Isterra Közép-Európa Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	110 - 120 nap
Ezermagtömeg:	180 - 200 g
Javasolt tőszám:	600 - 650.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12,5 - 25 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 15.
Fehérjetartalom:	39 - 42 %
Olajtartalom:	20 - 22 %

Kínálatunk jól ismert, igen korai (00) fajtája. Tenyészidejét meghazudtoló kiemelkedő terméssel rendelkezik, fehérjetartalma is átlag feletti. 2023-2024-ben több termőhelyen 4,2-4,7 t/ha termést adott üzemi körülmények között. 2025-ben a Nyugat-Dunántúlon elérte a 3,7 t/ha-t, míg Borsodban és Békésmegyében az aszály ellenére is 3 t/ha felett termett. Alacsony, kiváló állóképességű, érése egyöntetű. Nagyon korán, szeptember első napjaiban veszteség nélkül takarítható be. Tőszám kísérleteinkből az látszik, hogy gabona vagy dupla gabona sortávval érdemes vetni. A gyomirtás során nem mutat érzékenységet a pendimetalin hatóanyagra.

ANIELLA

Fajtatulajdonos:

Saatbau Linz eGen

Fajtajogosult:

Saatbau Linz Hungária Kft.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészeitő:	110 - 129 nap
Ezermagtömeg:	207 g
Javasolt tőszám:	600.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	technológiától függ
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	42 %
Olajtartalom:	n.a.



Az ANIELLA az igen korai éréscsoport közepe-vége fele érő szójafajta. Termőképessége kiemelkedő, fehérje- és olajtartalma egyaránt kiváló, ezért mindhárom tulajdonság alapján 8-as AGES minősítést kapott. Ezermagtömege magas. A növény viszonylag magas, jó szárszilárdságú, megdőlésre nem hajlamos. Korai fejlődése intenzív. Barna köldökű, magja foltosodásra és elszíneződésre nem hajlamos. Jó ellenálló képességgel rendelkezik a főbb betegségekkel – különösen a peronoszpórával és a szklerotíniával – szemben.

AZOLIA

Fajtatulajdonos:

Saatbau Linz eGen

Fajtajogosult:

Saatbau Linz Hungária Kft.

Növekedés típusa: féldeterminált/determinált

Éréscsoport: igen korai

Tenyészdő: 110 - 133 nap

Ezermagtömeg: 191 g

Javasolt tőszám: 600.000 csíra/ha

Javasolt sortáv: technológiától függ

Javasolt vetési idő: április 15. után

Fehérjetartalom: 42,7 %

Olajtartalom: n.a.

Az AZOLIA az igen korai éréscsoport új generációjának kiemelkedő fajtája, amely az elismert, nagy teljesítményű ADELFA genetikai alapjaira épül. Kimagasló terméspotenciálja és magas fehérjehozama révén új szintet képvisel a korszerű szójatermesztésben. Érés idejének köszönhetően széles körű alkalmazkodóképességgel rendelkezik, így különböző termőhelyeken és termesztési régiókban egyaránt megbízható teljesítményt nyújt. Az AZOLIA erőssége a stabil egészségi állapot: kiváló betegség-ellenállóság jellemzi, miközben állománya a betakarításig egyenletesen és gyorsan érkezik. Ideális választás azoknak a termelőknek, akik a magas hozamot, a kiemelkedő fehérjetartalmat és a termesztésbiztonságot egyetlen fajtában keresik.

ES DIRECTOR

Fajtatulajdonos:

Lidea Hungary Kft.

Fajtajogosult:

Galldorf Zrt.

Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	115 - 120 nap
Ezermagtömeg:	185 - 195 g
Javasolt tőszám:	500 - 550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	18 - 50 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 10.
Fehérjetartalom:	38 - 39 %
Olajtartalom:	18 - 22 %

Az ország összes szójatermesztő területén termesztethető, kiváló termőképességű, korai betakaríthatóságú szója magas fehérjetartalommal. Terméspotenciálja az érési csoportján belül kimagasló. Nagyon gyors és intenzív kezdeti fejlődés jellemzi. Megdőlésre, pergésre nem hajlamos. Termesztése során a metribuzin hatóanyag tartalmú gyomirtó szerek használata nem javasolt!



NAUTILUS

Fajtatulajdonos:

Delta Agrar D.O.O. Szerbia

Fajtajogosult:

Betamag-Trade Kft.

Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészdő:	115 - 120 nap
Ezermagtömeg:	160 - 185 g
Javasolt tőszám:	550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12,5 - 45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	40 % <
Olajtartalom:	22 % <

A NAUTILUS szója rövid internódiumokkal rendelkező, nagy magvú fajta, amely kiemelkedő termésminőséget biztosít. Magas, 60 % feletti olaj- és fehérjetartalma értékesíti teszi takarmányozási és feldolgozási szempontból egyaránt. Erős szárának és kiváló állóképességének köszönhetően nem hajlamos a megdőlésre, emellett pergésre sem érzékeny, így biztonságos és megbízható termesztést tesz lehetővé.



APOLLINA

Fajtatulajdonos:

Saatbau Linz eGen

Fajtajogosult:

Lajtamag Kft.

Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	115 - 125 nap
Ezermagtömeg:	190 - 210 g
Javasolt tőszám:	600.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	technológiától függ
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	42 - 42,9 %
Olajtartalom:	20,7 %



Az APOLLINA az igen korai éréscsoportba tartozó szójafajta. Az egyre gyakoribbá váló szélsőségek miatt kiemelt tulajdonsága, hogy a klimatikus stressz-ellenállóképessége kimagasló, ráadásul magas termőképesség és fehérjehozam jellemzi. Ezermagtömege magas, köldökszíne világos, kiváló alapanyag. Közepes növénymagasságú fajta, kimagasló szárszilárdsággal. Kiváló kezdeti fejlődési erélyű, a fajtával gyors talajborítás érhető el. Pergésre nem hajlamos. Ausztriában 2021-ben a hivatalos állami kísérletekben 4,92 t/ha termésszintet produkált, 43,5 % fehérjetartalommal. Betegségekkel szembeni ellenállósága jó. Féldeterminált növekedésű, közepesen elágazó. Metribuzinra nem érzékeny.

LID CONSTRUCTOR

Fajtatulajdonos:

Lidea Hungary Kft.

Fajtajogosult:

Galldorf Zrt.

Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészeitő:	115 - 125 nap
Ezermagtömeg:	183 g
Javasolt tőszám:	500 - 550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 50 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	38,3 %
Olajtartalom:	18 - 22 %

A LID CONSTRUCTOR egy új generációs kimagasló termőképességű szójafajta a 00-ás éréscsoportban. Vetése az ország összes szójatermesztő területére javasolt. Nagyon jó agronómiai jellemzői közé sorolható a kezdeti fejlődési erély, a szárszilárdság és a pergéssel szembeni tolerancia. Mindezen tulajdonságai lehetővé teszik, hogy könnyen betakarítható. Betegségekkel szembeni toleranciája közepes, metribuzin hatóanyagra érzékeny. Termése étkezési célra is felhasználható.

POMPEI

Fajtatulajdonos:

Agroyomis Sp.

Fajtajogosult:

Agrár Auditker Kft./Szójamag Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészydő:	115 - 125 nap
Ezermagtömeg:	160 - 225 g
Javasolt tőszám:	450.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 45 cm
Javasolt vetési idő:	május 1 - május 31.
Fehérjetartalom:	42 % <
Olajtartalom:	20 - 23 %

A POMPEI fajta az új, magas hozamú generációkhoz tartozik, amely lehetővé teszi az 5 t/ha-nál nagyobb potenciális terméshozam elérését optimális termesztési körülmények között, precíz vetés és a megfelelő tápanyagutánpótlás mellett. Erektált növekedése miatt nem oldalhajtást növeszt, hanem helyette a főszáron a megszokottnál több hüvelyt hoz. A fajta étkezési felhasználásra alkalmas. A savanyú talajok kivételével minden talajon termesztethető.

RGT SHIVA

Fajtatulajdonos:

RAGT Semences

Fajtajogosult:

Pannon-Mag-Agrár Kft.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészdő:	115 - 125 nap
Ezermagtömeg:	180 - 200 g
Javasolt tőszám:	500 - 550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	41 - 43 %
Olajtartalom:	20 - 21 %

Az RAGT Semences által nemesített SHIVA a 00 éréscsoportba tartozó, élelmiszeripari felhasználásra ajánlott szója. Legfontosabb értéke a kiemelkedően magas fehérjetartalom és a stabil termőképesség. Kiváló állóképességű fajta, közepes növénymagassággal és magas hüvelybekötéssel, ami megkönnyíti a betakarítást. Indeterminált növekedési típusú, lila virágú növény, kedvező agronómiai tulajdonságokat mutat intenzív termesztési körülmények között is. Technológiai szempontból a SHIVA jó herbicidtoleranciával rendelkezik több hatóanyaggal szemben, ugyanakkor pendimetalin alkalmazása nem javasolt. A fajta ezermagtömege közepes, magköldöke világos színű, ez a tulajdonság kedvező az élelmiszeripari feldolgozásban. Tofuipari hasznosításra különösen alkalmas, mivel jó fehérjekinyerhetőséget, kedvező cukortartalmat és kiváló tofu-térfogatot mutat.



ALLIDEA

Fajtatulajdonos:

Saaten-Union Hungária Kft.

Fajtajogosult:

Saaten-Union Hungária Kft.

Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészeitő:	120 - 125 nap
Ezermagtömeg:	165 - 180 g
Javasolt tőszám:	550 - 600.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12,5 - 25 - 37,5 - 50 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 10.
Fehérjetartalom:	33 - 35 %
Olajtartalom:	23 - 24 %

Az ALLIDEA szójafajta mind normál, mind intenzív termesztés esetén nagy hozamok elérésére alkalmas. Gyors kezdeti fejlődésű, nagy termőképességű, generatív jellegű fajta. Átlagos növénymagassághoz gazdagon elágazó növényfelépítés társul, ennek ellenére megdőlésre nem hajlamos, a sorok gyorsan záródnak, jól kezelhető állományt képez. Univerzális, minden régióban jól teljesít, amely biztonsággal beérik.



LUISE PZO

Fajtatulajdonos:

PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg

Fajtajogosult:

RWA Magyarország Kft.

Növekedés típusa:	n.a.
Éréscsoport:	korai
Tenyészdő:	120 - 130 nap
Ezermagtömeg:	165 g
Javasolt tőszám:	500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	50 cm
Javasolt vetési idő:	április vége
Fehérjetartalom:	38,5 %
Olajtartalom:	22,9 %

A PZO Pflanzenzucht Oberlimpurg termékcsalád új fajtája. Kiemelkedő termésopotenciál jellemzi a korai éréscsoportban. A magok kisebb méretűek, köldökük színe sötétbarna, mint a jól ismert ORAKEL PZO. Megdőlésre és pergésre nem hajlamos. A homokos és közép kötött talajokat kedveli. Szklerotínia és vírus betegségekkel szemben ellenálló.



PASAT

Fajtatulajdonos:

Delta Agrar D.O.O. Szerbia

Fajtajogosult:

Betamag-Trade Kft.



Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészydő:	120 - 130 nap
Ezermagtömeg:	160 - 180 g
Javasolt tőszám:	500 - 550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	15 - 75 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 15.
Fehérjetartalom:	37 - 39 %
Olajtartalom:	20 - 22 %

Korai éréscsoportú (00/0) fajta, amely fővetésre, megkéssett, vagy másodvetésre is alkalmas. Kimagasló termésre képes. Termőképessége: 3,5-4,5 t/ha. Szára erős, megdőlésre nem hajlamos. Virágzata lila színű. Kiegyenlített, egységes érés és nagyméretű, kerek szemek jellemzik. Minden termőhelyre ajánlott, de elsősorban a nyugati és középső országrészben (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok), illetve az északi megyékben (Borsod-Abaúj-Zemplén) gazdálkodók részére ajánljuk.

RGT SAKUSA

Fajtatulajdonos:

RAGT Semences

Fajtajogosult:

Axereal Hungary Kft.

Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészeitő:	120 - 130 nap
Ezermagtömeg:	180 - 205 g
Javasolt tőszám:	500 - 550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 24 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	42,9 %
Olajtartalom:	22 %



Az RGT SAKUSA szójafajtát 2019-ben regisztrálták Franciaországban. A 00-ás szegmensben belül is az igen korai fajták közé tartozik. Az ország egész területén termesztethető stabil termésbiztonság mellett. Lila virág, sötétbarna magköldök jellemzi. Korán és biztonságosan betakarítható.

RGT SEFORA

Fajtatulajdonos:

RAGT Semences

Fajtajogosult:

Axereal Hungary Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	igen korai
Tenyészeitő:	120 - 130 nap
Ezermagtömeg:	200 - 210 g
Javasolt tőszám:	480 - 500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 24 - (45) cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 15.
Fehérjetartalom:	41 - 42 %
Olajtartalom:	21 - 22 %

Az RGT SEFORA az igen korai éréscsoport legújabb, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fajtája. A NÉBIH kísérleteiben fajtajelöltként 2020-ban és 2021-ben is az 1. helyen szerepelt. Az RGT SEFORA-t intenzív kezdeti fejlődés, jó szárszilárdság és kiváló termésstabilitás jellemzi. Ezt a termésstabilitást jól tükrözi a fajta 2021-es teljesítménye is a NÉBIH kísérleteiben.

RGT SUZA

Fajtatulajdonos:

RAGT Semences

Fajtajogosult:

Pannon-Mag-Agrár Kft.

Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészeitő:	120 - 130 nap
Ezermagtömeg:	180 - 200 g
Javasolt tőszám:	500 - 550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	39 - 40 %
Olajtartalom:	20 - 22 %



2023-ban újonnan elismert szója a korai szegmensből. Magyarország bármely szója termőterületén sikerrel szerepel. Minden talajtípuson biztonsággal termesztethető, stabil terméshozam jellemzi. Kedvező agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik. Étkezési célra is felhasználható. Megdőlésre nem hajlamos és kiválóan alkalmazkodik a széles nyomtávú műveléshez. Elágazási és stressztűrő képessége is kimagasló éppúgy, mint fehérje tartalma. Metribuzin és metobromuron toleráns, viszont pendimetalin hatóanyag tartalmú szerekre érzékeny, ezek használata kerülendő.

DILETTA

Fajtatulajdonos:

DONMARIO Seeds

Fajtajogosult:

Véka Trade Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészeitő:	120 - 135 nap
Ezermagtömeg:	186 g
Javasolt tőszám:	300 - 500.000 csíra / ha
Javasolt sortáv:	45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 15.
Fehérjetartalom:	38 - 39 %
Olajtartalom:	21 - 22 %

A DILETTA egy féldeterminált növekedésű korai szójafajta. A növény magassága az európai átlagot tekintve 70-90 cm. Megdőlésre nem hajlamos és kiválóan alkalmazkodik a széles nyomtávú műveléshez is. Elágazási és stressztűrő képessége kimagasló. A virág színe lila, hüvelye világos homokszínű. Minden talajtípusra ajánlott, stabil terméshozam és remek betegség ellenállóság jellemzi.

ALLUMIA

Fajtatulajdonos:

Saatbau Linz eGen

Fajtajogosult:

Saatbau Linz Hungária Kft.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészdő:	120 - 136 nap
Ezermagtömeg:	193 g
Javasolt tőszám:	600.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	technológiától függ
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	41,9 %
Olajtartalom:	n.a.

Az ALLUMIA korai érésű fajta, amely kiemelkedő termőképességgel rendelkezik. Az ausztriai vizsgálatok során 2023 és 2025 között a legmagasabb termésszintet érte el, különösen a szárazabb régiókban, ahol kiváló szárazságtűrő képessége is megmutatkozott. Jó fehérjetartalmának köszönhetően fehérjehozama is kiemelkedő. Fehér virágú, világos köldökszínű fajta. Pergésellenállósága nagyon jó, szára szilárd, a növény közepesen magas. Betegségellenállósága kiváló, emiatt az egyik legegészségesebb fajtának számít.



DOROTHY

Fajtatulajdonos:

Apsov Sementi

Fajtajogosult:

Isterra Közép-Európa Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészydő:	125 - 130 nap
Ezermagtömeg:	170 - 190 g
Javasolt tőszám:	500 - 550.000 mag/ha
Javasolt sortáv:	12,5 - 25 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 10.
Fehérjetartalom:	39 - 40 %
Olajtartalom:	21 - 22 %

Közepes magasságú, megdőlésre, kipergésre nem hajlamos, korai (0) fajta. Az alsó hüvely magassága átlagos. A szárazságot az átlagnál jobban tolerálja. Éréskor a levélvesztése gyors, korán betakarítható.

A terméspotenciálja 4,5-5 t/ha. Minősítésekor termése 10 %-kal haladta meg a standard fajták szintjét. Az elmúlt évek kisparcellás kísérleteiben évjáráttól függetlenül rendre az élen végzett. A több éves agrotechnikai kísérletek alapján minimum 500 ezer mag/ha normával javasoljuk elvetni. Jól elágazó fajta, ennek ellenére nem ajánljuk a 45 cm-nél szélesebb sortávolságot.

KAPRAL

Fajtatulajdonos:

Agroyoumis Sp.

Fajtajogosult:

Agrár Auditker Kft./Szójamag Kft.



Növekedés típusa:	determinált
Éréscsoport:	korai
Tenyészeitő:	125 - 130 nap
Ezermagtömeg:	170 - 220 g
Javasolt tőszám:	450.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 45 - 60 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	38 - 42 %
Olajtartalom:	18 - 21 %

A KAPRAL egy 00-ás éréscsoportú korai lengyel szójafajta. A növény magassága 80-100 cm, szárvastagsága 1-1,5 cm. A levelek tojásdad alakúak, lekerekítettek, szürkén szőrözöttek. A virág színe lila. A magok ovális alakúak, sárga színűek és köldökük világosbarna. A fajta termés potenciálja 5 t/ha felett van.

SHEILA

Fajtatulajdonos:

RAGT Semences

Fajtajogosult:

Gabonakutató Nonprofit Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészdő:	125 - 130 nap
Ezermagtömeg:	170 - 190 g
Javasolt tőszám:	500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 24 - 48 - 50 cm
Javasolt vetési idő:	április 25 - május 25.
Fehérjetartalom:	40 - 42 %
Olajtartalom:	19 - 22 %

2005-ben elismert fajta. Éréscsoportját meghazudtolóan, magas növésű, jó szárszilárdságú fajta. Barna szőrözöttségű, lila virágú. Magja sárga köldökű. Alapvetően szimpla és dupla gabona sortávolságra javasoljuk vetni, de habitusát tekintve, szélesebb, kultivátorozható sortávolságon is nagy termést ad.

STINE 07P32

Fajtatulajdonos:

Stine Seed Company (USA)

Fajtajogosult:

Agro Masters Hungary Kft.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyésztidő:	125 - 130 nap
Ezermagtömeg:	170 - 220 g
Javasolt tőszám:	350 - 400.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	37 - 39%
Olajtartalom:	20 - 22%

A STINE 07P32 egy olyan korai szója, amely a biztonságos érésre, a stabil hozamra és a jó alkalmazkodóképességre épít. Fő erőssége a megbízható, kiegyenlített termésszint még gyengébb adottságú területeken is. A fajta jó stressztűrővel rendelkezik (hő- és vízhiány). Egyenletes kelés, gyors kezdeti fejlődés, erős gyökérzet, jó állóképesség, egységes állománykép jellemzi. Nagy elágazási kapacitást mutat. Különösen ajánlott változó vagy gyengébb adottságú területekre, illetve azoknak a termelőknek, akik korai, biztonságos betakarítást és stabil hozamot keresnek.



STINE 11N20

Fajtatulajdonos:

Stine Seed Company (USA)

Fajtajogosult:

Agro Masters Hungary Kft.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészdő:	125 - 130 nap
Ezermagtömeg:	170 - 220 g
Javasolt tőszám:	350 - 400.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	38 - 40%
Olajtartalom:	19 - 21%



A STINE 11N20 egy kimagaslóan stabil, magas hozamú, ellenálló szója, amely különösen ajánlott azoknak a termelőknek, akik megbízható teljesítményt szeretnének változó körülmények között, fontosnak tartják a betegségekkel és fonálférgekkel szembeni ellenállóságot, magas terméspotenciált keresnek öntözött vagy jó adottságú területeken. Kiváló elágazóképessége segíti a hozamstabilitást. Jó szárszilárdság jellemzi. A STINE „Elite” hozamtesztjein átlagosan 106,1 % teljesítményt ért el. Kelés és kezdeti fejlődés kiváló, erőteljes gyökérzet, nagyon jó pergésállóság jellemzi.

BONGO

Fajtatulajdonos:

Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.

Fajtajogosult:

Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészdő:	125 - 140 nap
Ezermagtömeg:	150 - 170 g
Javasolt tőszám:	450 - 500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	25 - 50 cm
Javasolt vetési idő:	április 20 - május 15.
Fehérjetartalom:	40 %
Olajtartalom:	23 %

BONGO nevű új fajta a száraz termesztési körülményekhez jól alkalmazkodó genetika képviselője. A növény alacsony felépítésű, a Bétabonnál valamivel kisebb terméspotenciállal, viszont egészen kiemelkedő szárazságtűréssel rendelkezik. Magminősége a nagyon száraz 2024-es és 2025-ös években is egyenletes maradt. Termésbiztonsága szélsőségesebb körülmények között is lehetővé teszi a gazdaságos szójatermelést. Magyarország egész területén beérik és jól viseli a kései vetést is.



BÉTABON

Fajtatulajdonos:

Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.

Fajtajogosult:

Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészdő:	125 - 140 nap
Ezermagtömeg:	160 - 180 g
Javasolt tőszám:	450 - 500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	25 - 76 cm
Javasolt vetési idő:	április 20 - május 15.
Fehérjetartalom:	40 %
Olajtartalom:	23 %



A BÉTABON Magyarországon, száraz körülmények között nemesített, kiváló élelmiszeripari minőségű és nagy termőképességű új fajta. Külleme, indeterminált növekedési típusa nemcsak megkülönbözteti a többi fajtától, hanem nagy stressztűrőképességéhez is hozzájárul. Világos sárga köldöke, egyenletes színe ideális élelmiszeripari fajtává teszi. Az öntözött körülményeket meghálálja, ott elég alacsonyabb csíraszámmal vetni. A NÉBIH fajtakísérletekben BSF 1911 néven mindig dobogós helyen szerepelt. Az egész ország területén beérik.

CAMERON

Fajtatulajdonos:

Apsov Sementi

Fajtajogosult:

Isterra Közép-Európa Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészidő:	128 - 130 nap
Ezermagtömeg:	170 - 190 g
Javasolt tőszám:	500 - 550.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12,5 - 25 - 45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 5.
Fehérjetartalom:	36 - 38 %
Olajtartalom:	21 - 22 %

2024-ben elismert kiemelkedő termőképességű korai (0) fajta. Tenyészideje ideális, a korai csoport közepén érik. Közepes magasság és kiváló állóképesség jellemzi. Pergésre nem hajlamos. Termése vetekszik a középérésű szójákéval, de jóval korábban, szeptember második felében betakarítható. Könnyen és veszteségmentesen aratható, mert az alsó hüvelyek magasan helyezkednek el. A 2025. évi agrotechnikai kísérletben a legnagyobb termést a 25 cm-es sortávnál érte el.

LEVENTE

Fajtatulajdonos:

Agrár Auditker Kft./Szójamag Kft.

Fajtajogosult:

Agrár Auditker Kft./Szójamag Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészdő:	130 - 140 nap
Ezermagtömeg:	220 - 240 g
Javasolt tőszám:	500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	38 - 39 %
Olajtartalom:	18 - 20 %

A LEVENTE egy 0/00-ás éréscsoportú magyar szójafajta. Felhasználását tekintve étkezési célra is alkalmas. A növény magassága közepes, 80-120 cm, szárának vastagsága 2-3 cm. Levele csúcsos tojás alakú, közepes nagyságú és élénkzöld színű. A virág színe lila. A magok gömbölyű, sárga színűek, köldökük színe fehér. A fajta terméspotenciálja 4-4,5 t/ha felett van.

LID BOUTONDOR

Fajtatulajdonos:

Lidea Hungary Kft.

Fajtajogosult:

Galldorf Zrt.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	korai
Tenyészdő:	130 - 140 nap
Ezermagtömeg:	150 g
Javasolt tőszám:	450 - 500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	25 - 75 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	39,5 %
Olajtartalom:	18 - 22 %

A LID BOUTONDOR szójafajta a korai éréscsoport közepén elhelyezkedő fajta, ezért az összes hazai szójatermesztő területen biztonságosan termeszthető. Az évjárat stabilitása jó, pergésre nem hajlamos. Betegségekkel szembeni toleranciája szintén jó, de a termesztése során a pendimetalin hatóanyag tartalmú gyomirtók szerek használata nem javasolt.



ES GENERATOR

Fajtatulajdonos:

Lidea Hungary Kft.

Fajtajogosult:

Isterra Közép-Európa Kft.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	közép
Tenyészeitő:	135 - 140 nap
Ezermagtömeg:	190 - 220 g
Javasolt tőszám:	450 - 500.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	25 - 45 cm
Javasolt vetési idő:	április 10 - április 30.
Fehérjetartalom:	38 - 40 %
Olajtartalom:	21 - 22 %

A középérésű (1) éréscsoport kimagasló termőképességű fajtája. Kezdeti fejlődése gyors. Sok elágazást fejleszt, ezzel tovább nő a hüvelyszám és a terméspotenciál is. Terméseredménye a Magyar Szója kísérleteiben az elmúlt három évben a 12 helyből 10 alkalommal volt a TOP 3-ban, 2025-ben a kísérletek abszolút győztese. 2025-ben kihasználva kiváló aszálytűrését azon kevés fajta közé tartozott, amivel üzemi táblákon 3,5-4 t/ha termést is el lehetett érni. Az ország középső és déli területein javasoljuk vetését.



ES MEDIATOR

Fajtatulajdonos:

Lidea Hungary Kft.

Fajtajogosult:

Galldorf Zrt.

Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	közép
Tenyészeitő:	135 - 145 nap
Ezermagtömeg:	211 g
Javasolt tőszám:	400 - 430.000 csíra / ha
Javasolt sortáv:	24 - 75 cm
Javasolt vetési idő:	április 10 - április 30.
Fehérjetartalom:	38 - 39%
Olajtartalom:	20 - 22%



Az ország középső és déli területeinek igen kedvelt fajtája. Az egyik legnagyobb mennyiségben értékesített, évek óta a köztermesztésben lévő, stabil Lidea szója. Intenzív körülmények között kimagasló, 5 t/ha feletti termésre képes. A Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület 2023. évi feldolgozott kísérleteinek adatai alapján bőven 4 t/ha felett teljesített, Hobolon 4,94 t/ha volt a betakarított mennyiség, míg Homorúdon 4,38 t/ha. Robusztus állományú, de kiváló szárstabilitása miatt megdőlésre kevésbé hajlamos. Szklerotíniával szembeni toleranciája átlag feletti.

POSEIDON

Fajtatulajdonos:

Delta Agrar D.O.O. Szerbia

Fajtajogosult:

Betamag-Trade Kft.



Növekedés típusa:	féldeterminált
Éréscsoport:	közép
Tenyészdő:	135 - 145 nap
Ezermagtömeg:	165 - 195 g
Javasolt tőszám:	350 - 450.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12,5 - 75 cm
Javasolt vetési idő:	április 15. után
Fehérjetartalom:	39 % <
Olajtartalom:	22 % <

A POSEIDON szója elsősorban a déli országrész termőhelyeire ajánlott, ahol intenzív fejlődési erélyével kiemelkedő teljesítményt nyújt. Rendkívül intenzív fajta, amely sok oldalhajtást fejleszt, ezzel hozzájárulva a magas terméspotenciálhoz. Alsó hüvelymagassága 18-23 cm, ami kedvező betakaríthatóságot biztosít. Fehér virágai mellett külön érdekessége, hogy a 2026-os év új fajtájaként került bevezetésre.

RGT STRAVIATA

Fajtatulajdonos:

RAGT Semences

Fajtajogosult:

Axereal Hungary Kft.



Növekedés típusa:	indeterminált
Éréscsoport:	közép
Tenyészeitő:	137 - 145 nap
Ezermagtömeg:	180 - 190 g
Javasolt tőszám:	450.000 csíra/ha
Javasolt sortáv:	12 - 24 - 45 cm
Javasolt vetési idő:	április 15 - május 15.
Fehérjetartalom:	41 - 42 %
Olajtartalom:	21 - 22 %


A modern nyugat-európai szójanemesítés legújabb mérföldköve az I-es éréscsoportban. Az RGT STRAVIATA a 2018-as és 2019-es, valamint a 2020-as üzemi eredményei alapján keltette fel a szójatermesztők figyelmét. A fajtát kiváló termésstabilitás és szárszilárdság jellemzi. A kimagasló ezermagtömeg jellemzően átlagon felüli fehérjetartalommal párosul. A kifejezetten az ország déli területeire szánt fajta a szklerotíniával szemben is kimagasló stabilitást mutat.

SZÓJA NÖVEKEDÉSI


Determinált - Féldeterminált -

DETERMINÁLT

FÉLDETERMINÁLT



A főszár a virágzás kezdetén lezárja növekedését.



A főszár növekedése a virágzás után még részben folytatódik.

Növekedés	Korán leáll	Részben folytatódik
Növénymagasság	Alacsony-közepes	Közepes
Virágzás és érés	Egyöntetű, koncentrált	Kiegyensúlyozott
Hüvelykötés	Koncentrált	Kiegyensúlyozott
Terméspotenciál	Közepes	Jó
Állóképesség (megdőlés)	Jó	Jó
Vízleadás, betakarítás	Gyors, egyöntetű	Kiegyensúlyozott
Alkalmazkodóképesség	Jó szárazabb körülményekhez	Széles körű

ELŐNYEI

- Korai betakarítás
- Könnyű aratás
- Jó szárazságtűrés

HÁTRÁNYAI

- Kisebb kompenzációs képesség
- Korlátozottabb terméspotenciál

ELŐNYEI

- Stabil termés
- Jó alkalmazkodóképesség
- Kiegyensúlyozott hozam és koraiság

HÁTRÁNYAI

- Nem extrém korai
- Nem extrém nagy hozamú




TIPP: A megfelelő növekedési típus kiválasztásával optimalizálható a termésbiztonság, a betakarítás időzítése és a

TÍPUSOK

Indeterminált

INDETERMINÁLT



A főszár virágzás közben is tovább növekszik, új nóduszokat és hüvelyeket képez.

Virágzás alatt is folyamatos

Közepes–magas, magas

Elhúzódóbb, fokozatos

Folyamatos, magas potenciál

Magas

Közepes–jó

Lassabb, egyenetlenebb

Intenzív körülmények között kiváló

ELŐNYEI

- Nagy terméspotenciál
- Jobb kompenzációs képesség stressz után
- Intenzív technológiában kiemelkedő

HÁTRÁNYAI

- Megdőlési kockázat
- Hosszabb vízleadás
- Egyenetlenebb érés

JELMAGYARÁZAT

Vegetatív szakasz:
levelek és szár fejlődése

Generatív szakasz:
virágzás, hüvelyképződés, magszáradás

--- A főszár növekedésének lezárása, illetve folytatódása

ÖSSZEFOGLALÁS

A növekedési típus megválasztása nagyban függ a termesztési cél-tól, a termőhely adottságaitól és az alkalmazott technológiától. A determinált típus a koraiságot és biztonságot, az indeterminált típus a maximális hozam-potenciált, míg a féldeterminált típus a kettő közötti optimális egyensúlyt képviseli.

a terméspotenciál.

Forrás: Fehr, W.R. & Caviness, C.E. (1977): Stages of Soybean Development Iowa State University, Cooperative Extension Service, Special Report 80.

FŐ TÁMOGATÓK



TÁMOGATÓK



AGRO-GÁRDA ZRT.



BETAMAG-TRADE KFT.



AltoTerra



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

TÁMOGATÓK



DEBRECENI EGYETEM AKIT
Növényfajta Kutatási Központ



SAATBAU

Saat gut, Ernte gut.



Az érték ami összeköt

**NÉBIH GYULATANYAI
KÍSÉRLETI ÁLLOMÁS**



Pap és Papp Kft.




PHYLAZONIT^{NG}
NEW GENERATION

VÄDERSTAD

Sencrop

VÉKA TRADE KFT.





MAGYAR SZÓJA

**Magyar Szója és
Fehérjenövény Egyesület**



9200 Mosonmagyaróvár
Ostermayer utca 24.



info@magyarszoja.hu



www.magyarszoja.hu